

RECOMENDACIONES PARA LA TROMBOPROFILAXIS DE PACIENTES HOSPITALIZADOS SEGÚN NIVEL DE RIESGO DE TEV					
NIVEL DE RIESGO	CARACTERÍSTICAS COMPATIBLES CON EL NIVEL DE RIESGO Pacientes con... ALTO RIESGO DE HEMORRAGIA O CON HEMORRAGIA ACTIVA. NO DAR ANTITROMBÓTICOS!!!	NIVEL DE EVIDENCIA	OPCIONES DE TROMBOPROFILAXIS RECOMENDADAS	NIVEL DE EVID.	DOSIS INICIO DEL TRATAMIENTO DURACIÓN DEL TRATAMIENTO
CONTRAINDICADA LA TPF	Enfermedad de manejo médico + FR adicionales de TEV, pero contraindicada la tromboprofilaxis por hemorragia activa o riesgo de hemorragia		Uso óptimo de TPMC ya sea con MC o con CNI	1A	Hasta que el riesgo de hemorragia disminuya, entonces iniciar TPF como sustituto o como adicional a la TPMC (1C) Se prefiere la HBPM a la HNF
	Cirugía general, ginecológica o urológica			1C	
	Cirugía torácica o bypass de arteria coronaria con alto riesgo de hemorragia o con hemorragia activa		Uso óptimo de TPMC con BVP o CNI	1A	
	Artroplastia de cadera			1A	
	Artroplastia de rodilla		Uso óptimo de TPMC con CNI	1A	
			Uso óptimo de BVP	1B	
	Cirugía de Fractura de Cadera		Uso óptimo de CNI	1A	
	Trauma Mayor		Uso óptimo de CNI o MC	1B	
	Trauma Raqui Medular			1A	
	Quemados		Uso óptimo de CNI o MC	1A	Hasta que el riesgo de hemorragia disminuya (1A)

FR= factores de riesgo, TP=tromboprofilaxis, TPF=tromboprofilaxis farmacológica, TPMC=tromboprofilaxis mecánica, MC=Medias de compresión, CNI=Compresión neumática intermitente, BVP= bomba venosa de pies, HBPM= heparina de bajo peso molecular, HNF=heparina no fraccionada, AVK=antagonistas de la vitamina K.

Tabla 8. Recomendaciones para la tromboprofilaxis de los pacientes hospitalizados clasificados como de alto riesgo de hemorragia o con hemorragia activa y en quienes está contraindicado el uso de agentes antitrombóticos.