

RECOMENDACIONES PARA LA TROMBOPROFILAXIS DE PACIENTES HOSPITALIZADOS SEGÚN NIVEL DE RIESGO DE TEV					
NIVEL DE RIESGO	CARACTERÍSTICAS COMPATIBLES CON EL NIVEL DE RIESGO Pacientes con...	NIVEL DE EVIDENCIA	OPCIONES DE TROMBOPROFILAXIS RECOMENDADAS	NIVELES DE EVIDENCIA	DOSIS INICIO DEL TRATAMIENTO DURACIÓN DEL TRATAMIENTO
M O D E R A D O R I E S G O	Enfermedad médica aguda confinado a la cama	1A			
	Cirugía menor con factores de riesgo (FR) adicionales				
	Cirugía general mayor (> 30 minutos) para enfermedad benigna sin FR adicionales en pacientes menores de 40 años	1A	HBPM, HNF Fondaparinux	1A	Hasta que el paciente sea dado de alta del hospital (1A)
	Cirugía Bariátrica		HBPM HNF Fondaparinux TPF + CNI	1C	HBPM en altas dosis, mayores que para los pacientes no obesos HNF en dosis de acuerdo con el peso, mayores que en no obesos HNF 3 veces x día
	Cirugía Torácica Mayor		HBPM, HNF Fondaparinux	1C	
	Cirugía Ginecológica Mayor para Enfermedad benigna sin FR adicionales	1A	HBPM, HNF CNI	1A 1B	Iniciar justo antes de la cirugía (1B) Hasta que el paciente sea dado de alta (1A) o hasta que deambule (1B)
	Cirugía ginecológica laparoscópica + FR adicionales	1C	HBPM, HNF, MC, CNI	1C	
	Cirugía urológica mayor o procedimiento urológico abierto	1A	HNF, TPMC (MC, CNI) HBPM, Fondaparinux, TPF + TPMC	1B 1C	Iniciar justo antes de la cirugía (1B) hasta la deambulación (1B) HNF 2 a 3 veces por día (1B)
	Cirugía Laparoscópica + FR adicionales		HBPM, HNF, Fondaparinux, MC, CNI	1C	
	Artroscopia de rodilla + FR adicionales		HBPM	1B	
	Cirugía de columna electiva + FR adicionales		HBPM, HNF, CNI MC	1B 2B	La TPF posoperatoria La TPMC perioperatoria
	Neurocirugía Mayor	1A	Uso óptimo de la CNI HBPM HNF	1A 2A 2B	

FR= factores de riesgo, TP=trombopofilaxis, TPF=trombopofilaxis farmacológica, TPMC=trombopofilaxis mecánica, MC=Medias de compresión, CNI=Compresión neumática intermitente, HBPM= heparina de bajo peso molecular, HNF=heparina no fraccionada.

Tabla 5. Recomendaciones para la trombopofilaxis de los pacientes hospitalizados clasificados como de riesgo moderado.