

RECOMENDACIONES PARA LA TROMBOPROFILAXIS DE PACIENTES HOSPITALIZADOS SEGÚN NIVEL DE RIESGO DE TEV					
NIVEL DE RIESGO	CARACTERÍSTICAS COMPATIBLES CON EL NIVEL DE RIESGO Pacientes con...	NIVEL DE EVIDENCIA	OPCIONES DE TROMBOPROFILAXIS RECOMENDADAS	NIVELES DE EVIDENCIA	DOSIS INICIO DEL TRATAMIENTO DURACIÓN DEL TRATAMIENTO
<b>B A J O  R I E S G O</b>	Enfermedad de manejo médico, completamente móviles y sin factores de riesgo (FR) adicionales	1A	Ninguna tromboprofilaxis (TP) específica diferente a la movilización temprana y agresiva	1A	<b>N O  A P L I C A B L E</b>
	Cirugía menor (< 30 minutos), completamente móviles, menores de 40 años y sin FR adicionales				
	Cirugía ginecológica menor (< 30 minutos) sin FR adicionales				
	Cirugía ginecológica laparoscópica sin FR adicionales	1B			
	Cirugía urológica trasuretral	1A			
	Cirugía enteramente laparoscópica sin FR adicionales	1B		1B	
	Trauma menor sin FR adicionales				
	Artroscopia de rodilla sin FR adicionales	2B		2B	
	Cirugía de columna electiva sin FR adicionales	2C		2C	
	Trauma de Miembro Inferior distal a la rodilla y aislado	2A		2A	

FR= factores de riesgo, TP= tromboprofilaxis. Cirugía menor= entiéndase por cirugía menor aquella que dura menos de 30 minutos.

**Tabla 4.** Recomendaciones de tromboprofilaxis para los pacientes de bajo riesgo.